	STADIUM 1	STADIUM 2	STADIUM 3	STADIUM 4	STADIUM 5
Verbleibende Nierenfunktion in Prozent	Über 90 %	60 bis 89 %	30 bis 59 %	15 bis 29 %	Weniger als 15 %
Beschreibung des Stadiums	unauffälliger Harnstoff- und Kreatininwert	unauffälliger oder leicht erhöhter Harnstoff- und Kreatininwert	Erhöhung des Kreatininwertes, überhöhter Harnstoffwert und mitunter beginnende Anämie	Schwere Beeinträchtigung der Nieren. Sehr schwache Nierenfunktion.	Terminale Niereninsuffizienz. Sehr schwere Beeinträchtigung der Nierenfunktion.
GFR (glomeruläre Filtrationsrate)	90 ml/min oder mehr	60-89 ml/min	30-59 ml/min (Stadium 3A 45-59 ml/min; Stadium 3B 30 bis 44 ml/min)	15-29 ml/min	15 ml/min oder weniger
Symptome	Geringfügige Beeinträchtigung der Nieren. Normale oder überdurchschnittliche Nierenfunktion. Kein offensichtliches Symptom.	Fortschreitende Beeinträchtigung der Nieren. Unterdurchschnittliche Nierenfunktion. Kein offensichtliches Symptom.	Fortgeschrittene Beeinträchtigung der Nieren. Schwache Nierenfunktion. Auftreten der ersten Symptome: Appetitverlust, Müdigkeit und Juckreiz.	Sehr fortgeschrittene Beeinträchtigung der Nieren, sehr schwache Nierenfunktion. Anhaltende Müdigkeit, anhaltender Appetitverlust und Juckreiz.	Schlaflosigkeit, Atembeschwerden, Juckreiz und häufiges Erbrechen. Erhöhter Kreatinin- und Harnstoffwert.
Maßnahmen	Ermittlung der Ursachen und Versuch, sie zu beheben.	Überwachung des Kreatininwertes, des Blutdrucks, des Gesundheitszustands und des allgemeinen Wohlbefindens. Versuch, die Verschlechterung der Nierenfunktion aufzuhalten oder hinauszuzögern.	Fortsetzung des Versuchs, die Verschlechterung der Nierenfunktion aufzuhalten oder hinauszuzögern. Der Patient lernt, mit der Krankheit umzugehen und erfährt, welche Behandlungsoptionen es gibt.	Planung der Dialyse und Schaffung der Zugangsbedingungen. Durchführung der erforderlichen Untersuchungen im Hinblick auf eine eventuelle Nierentransplantation.	Einleitung oder Vorbereitung der Einleitung eines Nierenersatzverfahrens: Dialyse oder Transplantation.