


Continuará a receber tratamento com Clexane® em casa. Aqui está o que precisa de saber :

O Clexane® é administrado por via subcutânea, entre a pele e o músculo subjacente com uma injeção para proporcionar um tratamento “antitrombótico”.

Zonas de injeção :

- Abdomen : evitar a área periumbilical (2 dedos à volta do umbigo)
- Coxas



É essencial que siga exatamente estas instruções :

Caso tenha dúvidas, solicite o profissional da saúde para mais explicações.

- Antes de administrar o produto, por favor verifique que a dose corresponde a dose prescrita pelo o medico
- A injeção é feita 1x/dia de preferencia a mesma hora
- A zona de injeção tem de ser alternada todos os dias
- Nunca deve injetar um produto num hematoma, numa ferida ou zona vermelha !

Antes da injeção:

- Lave as suas mãos
- E importante não retirar a bolha de ar da seringa
- Encontre uma posição confortavel, deitado ou sentado
- Instale-se comodamente, em posição semi-reclinada ou sentada
- Desinfete o local da injeção com uma compressa embebida num desinfetante de pele alcoólica

Como fazer a injeção :

- A Clexane® deve ser administrada alternando entre o lado esquerdo e direito a cada aplicação
- A agulha deve ser introduzida perpendicularmente na espessura de uma prega cutânea feita entre os dedos polegar e indicador
- Proceda como na imagem e mantenha um angulo de 90°



Depois da injeção

- Não massajar a zona de injeção
- Caso você tenha dúvidas ou uma reação alérgica, solicite o profissional da saúde.

Visite nossa seção “Santé et bien-être de la femme” no site acteurdemasante.lu

